

# Caliban®

Surový úder proti plevelům



## Výhody aplikace

Účinnost na pýr plazivý, sveřepy, chundelku metlici, svízel, heřmánky a další plevel.  
Aplikace až do 2. kolénka pšenice. Dávka 250 g/ha.



SUMI AGRO CZECH s.r.o.  
Na Strži 63, 140 62 Praha 4  
tel.: 261 090 281-6  
fax: 261 090 280  
www.sumiagro.cz

Vladimír Čech  
Roman Procházka  
Jiří Andr  
Petr Lacina  
Jiří Tihelka  
Václav Noska  
Pavel Bureš

střední Čechy  
jižní a střední Morava  
východní a střední Čechy  
jižní Čechy a Vysočina  
severní Morava  
západní a severní Čechy  
Vysočina a Jižní Morava

725 534 009  
602 205 456  
602 177 885  
602 224 885  
725 745 285  
606 704 480  
724 298 840

# Caliban®

## Surový úder proti plevelům

Caliban je herbicid ve formě dispergovatelného granulátu určený k ochraně pšenice ozimé proti pýru plazivému, chundelce metlici, sveřepům a jednoletým dvouděložným plevelům včetně svízele přítuly.



### Působení

Účinná látka **propoxycarbazone-sodium** je přijímána listy a kořeny rostlin. V rostlinných pletivech je rozváděna akropetálně i bazipetálně. Účinná látka **iodosulfuron-methyl-sodium** je rostlinami přijímána především listy a v menší míře také prostřednictvím kořenů a v rostlinných pletivech je rozváděna akropetálně. **Mefenpyr** je herbicidní safener, který zvyšuje metabolismus účinné látky iodosulfuron-methyl-sodium v obilovinách, nikoli v plevelných rostlinách.

### Spektrum herbicidní účinnosti

#### ◆ Citlivé plevele

Pýr plazivý – aplikujte od 4 listů pýru do konce odnožování.  
Sveřep rolní, sveřep stoklasa, sveřep jalový – max. do konce odnožování.  
Chundelka metlice max. do poloviny odnožování, tj. BBCH 25.  
Potlačuje oves hluchý, lipnici roční, psárku polní, výdrol ječmene a ova.  
Plevele dvouděložné jednoleté max. do 8 pravých listů, především hořčici rolní, penízek rolní, výdrol řepky, kokošku pastuší tobolku, úhorník mnohodílný a další brukvovité plevele.  
Heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, hluchavka nachová max. do 8 pravých listů.  
Svízel přítula do 8 přeslenů až 2 boční výhony.

#### ◆ Méně citlivé plevele:

Violka rolní, pcháč oset.

### Návod na použití, dávkování

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování
pšenice ozimá	Pýr plazivý, sveřepy, chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovité plevele, dvouděložné plevele	250 g/ha 150–400 l vody/ha

### Doporučení pro aplikaci

Aplikace se provádí od 3 listů až do 2. kolénka pšenice ozimé (BBCH 13–32). Optimální termín je plné odnožování. Při pozdější aplikaci bývají plevele přerostlé a účinek na některé z nich nemusí být dostatečný. Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé plevele v době aktivního růstu za příznivých podmínek pro jejich růst a vývoj.

V případě nepříznivých podmínek pro růst a vývoj plevelů (dlouho trvající sucho, silná vosková vrstva na povrchu listů) doporučujeme pro dosažení optimálního účinku na plevele, **Caliban** kombinovat se smáčedlem **Spartan** (koncentrace 0,15 %), nebo s kapalným hnojivem **DAM 390**.