

PANOCTINE[®] 35LS

MOŘIDLA

Účinná látka: 350 g/l guazatine (tj. směs oktamethylendiaminu a oktamethylenbisiminoktamethylendiaminu ve formě guazatine-triacetátu)

Kompletní fungicidní mořidlo k moření osiv pšenice, žita a tritikale.

Doba použití: 3 roky od data výroby
Formulace: kapalný koncentrát mísitelný s vodou
Registrační číslo: 3386 - 3
Balení: 25 l, 50 l, 200 l, 1000 l kanystry, sudy, kontejnery
Výrobce: AKZO NOBEL, Stockviksverken 85013 Sundsvall, Sweden

Působení přípravku

Panoctine 35 LS je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo bez použití jakýchkoli adhezivních látek. Obsahuje etylenglykol, nemrzne ani netuhne při teplotách do cca – 10° C. Jediné mořidlo, se kterým lze pracovat i za velmi nízkých teplot. Má vynikající přilnavost k osivu, osivo se nelepí, nepráší a má výbornou sypkost.

Spektrum účinnosti přípravku

Nejúčinnější mořidlo proti plísni sněžné a dalším fusariózám (*Fusarium nivale*, *Fusarium roseum*, *Fusarium culmorum*, *Fusarium gramineum*).
 Výborný účinek na: Braničnatky (*Septoria nodorum*), sněti mazlavé (*Tilletia caries*).

Použití a dávkování přípravku

plodina	škodlivý činitel	dávka (l/t osiva)	poznámka
Pšenice	sněť mazlavá plíseň sněžná braničnatky	2 l/t	moření osiv
Žito ozimé tritikale	plíseň sněžná	2 l/t	moření osiv



PANOACTINE® 35LS

Doporučení pro použití

Používají se mořící zařízení pro moření osiv mokrou cestou.

V případě potřeby je možno k registrované dávce 2 l/t osiva přidat 2 l vody.

Moření se smí provádět jen na zařízeních, která zaručují přesné a rovnoměrné dávkování a pokrývnost osiva mořidlem. Osivo má mít dokonalou klíčivost a vzcházivost a nesmí být mechanicky poškozeno.

Namořené osivo musí být vyseto a zahrnuto zeminou, zbylé osivo pak spotřebujte např. vysetím do směsek na zelené hnojení.

Zbytky namořené osiva nesmí být použity pro krmení zvířat a ptáků!

Namořené osivo doporučujeme skladovat v suchých, dobře větraných a chladných prostorách. Osivo vysévat co nejdříve. Pokud je namořené osivo skladováno do další sezóny, doporučujeme před výsevem znovu provést zkoušku klíčivosti.

POZOR! Nemíchat Panoactine 35 LS s jinými přípravky! Při změně mořidla a mořícího režimu je nutno zařízení důkladně vyčistit!

Panoactine 35 LS nemá žádné omezení použití v PHO vod.

Panoactine 35 LS má výrazný repelentní účinek proti zrnožravým ptákům.

