

Kabuki®



# Kabuki®



Obsahuje pyraflufen ethyl 26,5 g/l (2,5%)

Evidenční číslo: 4773-0

## Použití přípravku Kabuki

- určen pro likvidaci výmladků v sadech a vinicích a pro desikaci brambor
- působí kontaktně
- ničí dvouděložné plevely v ranějších růstových fázích
- přispívá k omezení šíření houbových chorob
- použitelný v rámci integrované ochrany rostlin

Plodina	Účel použití	Dávka	OL	Poznámka
Brambor	desikace	0,8 l/ha + smáčedlo (TM)	10	14 dní před sklizní max. počet aplikací: 2x, interval 5–7 dní
Réva vinná	hubení výmladků	0,2 % (max. 0,8 l/ha) + smáčedlo (TM)	AT	od 3. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm max. počet aplikací: 1x
Jádroviny, peckoviny	hubení výmladků	0,8 l/ha + smáčedlo (TM)	AT	od 2. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm max. počet aplikací: 2x, interval 14 dní
Rybíz, angrešt	hubení výmladků	0,8 l/ha + smáčedlo (TM)	AT	od 3. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm max. počet aplikací: 1x

Pro zajištění odpovídající účinnosti je nutné použít smáčedla.

Doporučujeme aplikaci v TM s přípravkem Spartan v koncentraci 0,1–0,15 %.


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

# Réva vinná


Aplikujte max. 1x ročně. Zelené části necílové vegetace nesmějí být postřikem zasaženy. Použijte 300–400 l vody na hektar.

Výsledky registračních pokusů v révě vinné na odstraňování výmladků - Rakousko 2007

## Účinnost Kabuki na výmladky (%) - Gleisdorf




## Účinnost Kabuki na výmladky (%) - Gamlitz




# Jádroviny, peckoviny

Aplikujte na likvidaci výmladků max. 2x ročně s intervalem mezi aplikacemi min. 14 dní.  
Použijte 300–400 l vody na hektar. Je nutné zamezit přímému ošetření sklizňového produktu.

## Účinnost přípravku Kabuki na boční výmladky po první aplikaci (%)




## Herbicidní účinnost Kabuki, po 1. aplikaci (%)






## Účinnost přípravku Kabuki na boční výmladky po druhé aplikaci (%)



## Herbicidní účinnost Kabuki, po 2. aplikaci (%)




# Brambory

Přípravek KABUKI aplikujte postřikem na porost brambor 14 dní před plánovaným sběrem. Použijte 200–400 l vody na hektar. Aplikujte max. 2x s intervalem mezi aplikacemi 5–7 dní.


Přípravek KABUKI nemá negativní vliv na výnos, velikost hlíz ani na klíčení hlíz v následujícím roku.

## Výsledky registračních pokusů v bramborách

### Procento desikace brambor po aplikaci přípravkem Kabuki - listy




### Procento desikace brambor po aplikaci přípravkem Kabuki - stonky





**Nástup desikačního účinku po aplikaci přípravku Kabuki na listy a stonky - v %**



# Rybíz, angrešt

Aplikujte max. 1x ročně. Zelené části nesmějí být postřikem zasaženy. Použijte 300–600 l vody na hektar. Je nutné zamezit přímému ošetření sklizňového produktu.

# Regionální zástupci

**Ing. Vladimír Sys**

mobil: 602 669 739  
vladimir.sys@sumiagro.cz

**Ing. Jakub Řezanina**

mobil: 602 177 885  
jakub.rezanina@sumiagro.cz

**Ing. Jan Herman**

mobil: 724 298 840  
jan.herman@sumiagro.cz

**Ing. Jiří Frait**

mobil: 725 745 285  
jiri.frait@sumiagro.cz

**Ing. Václav Noska**


mobil: 606 704 480  
vaclav.noska@sumiagro.cz

**Ing. Petr Lacina**

mobil: 602 224 885  
petr.lacina@sumiagro.cz

**Ing. Roman Procházka**

mobil: 602 205 456  
roman.prochazka@sumiagro.cz



**SUMI AGRO CZECH s.r.o.**

Na Strži 65, 140 00 Praha 4

tel.: 261 090 281-8

fax: 261 090 280

www.sumiagro.cz

