

Kabuki®



Kabuki®



Obsahuje pyraflufen ethyl 26,5 g/l (2,5%)

Evidenční číslo: 4773-0

Použití přípravku Kabuki

- určen pro likvidaci výmladků v sadech a vinicích a pro desikaci brambor
- působí kontaktně
- ničí dvouděložné plevely v ranějších růstových fázích
- přispívá k omezení šíření houbových chorob
- použitelný v rámci integrované ochrany rostlin

Plodina	Účel použití	Dávka	OL	Poznámka
Brambor	desikace	0,8 l/ha + smáčedlo (TM)	10	14 dní před sklizní max. počet aplikací: 2x, interval 5–7 dní
Réva vinná	hubení výmladků	0,2 % (max. 0,8 l/ha) + smáčedlo (TM)	AT	od 3. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm max. počet aplikací: 1x
Jádroviny, peckoviny	hubení výmladků	0,8 l/ha + smáčedlo (TM)	AT	od 2. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm max. počet aplikací: 2x, interval 14 dní
Rybíz, angrešt	hubení výmladků	0,8 l/ha + smáčedlo (TM)	AT	od 3. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm max. počet aplikací: 1x

Pro zajištění odpovídající účinnosti je nutné použít smáčedla.

Doporučujeme aplikaci v TM s přípravkem Spartan v koncentraci 0,1–0,15 %.


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Réva vinná


Aplikujte max. 1x ročně. Zelené části necílové vegetace nesmějí být postřikem zasaženy. Použijte 300–400 l vody na hektar.

Výsledky registračních pokusů v révě vinné na odstraňování výmladků - Rakousko 2007

Účinnost Kabuki na výmladky (%) - Gleisdorf




Účinnost Kabuki na výmladky (%) - Gamlitz




Jádroviny, peckoviny

Aplikujte na likvidaci výmladků max. 2x ročně s intervalem mezi aplikacemi min. 14 dní.
Použijte 300–400 l vody na hektar. Je nutné zamezit přímému ošetření sklizňového produktu.

Účinnost přípravku Kabuki na boční výmladky po první aplikaci (%)




Herbicidní účinnost Kabuki, po 1. aplikaci (%)






Účinnost přípravku Kabuki na boční výmladky po druhé aplikaci (%)



Herbicidní účinnost Kabuki, po 2. aplikaci (%)




Brambory

Přípravek KABUKI aplikujte postřikem na porost brambor 14 dní před plánovaným sběrem. Použijte 200–400 l vody na hektar. Aplikujte max. 2x s intervalem mezi aplikacemi 5–7 dní.


Přípravek KABUKI nemá negativní vliv na výnos, velikost hlíz ani na klíčení hlíz v následujícím roku.

Výsledky registračních pokusů v bramborách

Procento desikace brambor po aplikaci přípravkem Kabuki - listy




Procento desikace brambor po aplikaci přípravkem Kabuki - stonky





Nástup desikačního účinku po aplikaci přípravku Kabuki na listy a stonky - v %



Rybíz, angrešt

Aplikujte max. 1x ročně. Zelené části nesmějí být postřikem zasaženy. Použijte 300–600 l vody na hektar. Je nutné zamezit přímému ošetření sklizňového produktu.

Regionální zástupci

Ing. Vladimír Sys

mobil: 602 669 739
vladimir.sys@sumiagro.cz

Ing. Jakub Řezanina

mobil: 602 177 885
jakub.rezanina@sumiagro.cz

Ing. Jan Herman

mobil: 724 298 840
jan.herman@sumiagro.cz

Ing. Jiří Frait

mobil: 725 745 285
jiri.frait@sumiagro.cz

Ing. Václav Noska


mobil: 606 704 480
vaclav.noska@sumiagro.cz

Ing. Petr Lacina

mobil: 602 224 885
petr.lacina@sumiagro.cz

Ing. Roman Procházka

mobil: 602 205 456
roman.prochazka@sumiagro.cz



SUMI AGRO CZECH s.r.o.

Na Strži 65, 140 00 Praha 4

tel.: 261 090 281-8

fax: 261 090 280

www.sumiagro.cz

