

Regionální zástupci

Ing. Vladimír Sys
mobil: 602 669 739
vladimir.sys@sumiagro.cz

Ing. Veronika Brzobohatá
mobil: 602 177 885
veronika.brzobohata@sumiagro.cz


Ing. Jiří Frait
mobil: 725 745 285
jiri.frait@sumiagro.cz

Ing. Roman Procházka
mobil: 602 205 456
roman.prochazka@sumiagro.cz

Ing. Václav Noska
mobil: 606 704 480
vaclav.noska@sumiagro.cz

Ing. Petr Lacina
mobil: 602 224 885
petr.lacina@sumiagro.cz

Ing. Jan Herman
mobil: 724 298 840
jan.herman@sumiagro.cz



SUMI AGRO

Brambory

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281-8, fax: 261 090 280
www.sumiagro.cz



Moncut 40 SC

**Nemoříš?
Nesklidíš!**

Flutolanil 460 g/l

Dávka: 0,2 l/t

- cenově nejvýhodnější moření na trhu

Gamit 36 CS

Plevelé ani nevzejdou

Klomazon 360 g/l

Dávka: 0,25 l/ha

- bez omezení
- skvěle rozšiřuje plevelohubné spektrum

Pro preemergentní aplikaci v TM v dávce 0,2 l/ha

Citation

Pre i Post - plevelů prost

Metribuzin 700 g/kg

Dávka: 0,5 kg/ha

- osvědčená účinnost
- kombinace i s glyfosátem při PRE použití

TM s Gamitem 36 CS

Troy 480

**Heřmánky a rmeny
Troyem vyřešeny**

Bentazon 480 l/ha

Dávka: 2 l/ha

- účinkuje na široké spektrum plevelů
- další možnosti pro použití do luskovin

Aplikujte v rané růstové fázi plevelů

Sviton Plus

**Povolený doping pro
brambory**

1,4-nitrofenolát sodný 9 g/l
1,2-nitrofenolát sodný 6 g/l
5-nitroguajakolát sodný 3 g/l

Dávka: 0,2 l/ha

- regenerace
- stimulace
- antistresový účinek

Možnost použití s fungicidy. 2–3 aplikace za vegetaci

Spartan

**Ideální partner do
nepohody**

Alkylamine ethoxylate
propoxylate 500 g/l

Dávka: 0,1–0,15%

- zvyšuje účinnost aplikovaných pesticidů
- zlepšuje kvalitu postřikové kapaliny
- zvyšuje příjem účinných látek

TM se všemi herbicidy, fungicidy a insekticidy

Mospilan 20 SP

**Japonský vítěz nad
americkým broukem**

Acetamiprid 200 g/kg

Dávka: 60 g/ha

- kombinace s fungicidy
- dlouhodobá účinnost 3 týdny po aplikaci

Ošetření směřujte výhradně na larvy ve stádiu L1 L2. Použijte se Spartanem

Markate 50

To mrkáte na Markate

Lambda-cyhalothrin 50 g/l

Dávka: 0,15 l/ha

- okamžitý účinek
- 4x za vegetaci proti přenašečům viróz

Aplikujte při překročení prahu hospodářské škodlivosti

Mixanil

Nejlepší volba na startu

Chlorthalonil 375 g/l
Cymoxanil 50 g/l

Dávka: 2 l/ha

- možnost použití 2x za vegetaci
- významně zabraňuje šíření skládkových chorob

Výhodný pro první a druhou aplikaci

Kabuki

Novinka na scéně

Pyraflufen-ethyl 26,5 g/l

Dávka: 0,8 l/ha

- desikant s pozvolnějším nástupem účinku
- zabrání opětovnému obrůstání
- možnost použití při posledním fungicidním ošetření

Aplikace vyžaduje adjuvant - Spartan

Quad Glob 200 SL

**Specialista na desikaci,
když Vás tlačí čas**

Diquat 200 g/l

Dávka: 4 l/ha

- do 5 dnů po aplikaci jsou rostliny zcela desikovány
- déšť do 15 minut po aplikaci nesnižuje účinnost

Dbejte na dostatečné množství aplikační kapaliny



Sadba

Preemergentně
po slepé proorávce

Pre po slepé proorávce
až Post do výšky
brambor 10–15 cm

Post - 10–15 cm
výška brambor

BBCH 30–79

BBCH 32–39

Červen–červenec

Červen–červenec

BBCH 40–69

BBCH 80–89

BBCH 80–89

