

Regionální zástupci

Ing. Vladimír Sys

mobil: 602 669 739
vladimir.sys@sumiagro.cz

Ing. Jakub Řezanina

mobil: 602 177 885
jakub.rezanina@sumiagro.cz

Ing. Jiří Frait

mobil: 725 745 285
jiri.frait@sumiagro.cz

Ing. Roman Procházka

mobil: 602 205 456
roman.prochazka@sumiagro.cz

Ing. Václav Noska


mobil: 606 704 480
vaclav.noska@sumiagro.cz

Ing. Petr Lacina

mobil: 602 224 885
petr.lacina@sumiagro.cz

Ing. Jan Herman

mobil: 724 298 840
jan.herman@sumiagro.cz



SUMI AGRO CZECH s.r.o.

Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281-8, fax: 261 090 280
www.sumiagro.cz



SUMI AGRO

Chmel



Sviton Plus

Povolený doping

1,4-nitrofenolát sodný 9 g/l
1,2-nitrofenolát sodný 6 g/l
5-nitroguajakolát sodný 3 g/l

0,2 l/ha

- regenerace poškozených pletiv (kroupy)
- stimulace růstu
- snižuje stres ze sucha

Lze použít až 3x po celou dobu vegetace

Spartan

Ideální partner do nepohody

Alkylaminethoxylát propoxylát 500 g/l

0,1–0,15%

- zvyšuje účinnost aplikovaných pesticidů
- zlepšuje kvalitu postřikové kapaliny
- zvyšuje příjem účinných látek

TM se všemi herbicidy, fungicidy a insekticidy

Nissorun 10 WP

100% antikoncepce pro svilušky

Hexythiazox 100 g/kg

1,5 kg/ha

- jediný skutečně účinný ovicid, ničí i zimní vejčká
- silný translaminární účinek
- nejdelší reziduální účinnost 50–60 dnů
- nehubí dravé roztočce (*Typhlodromus* - populace Chelčice, Mikulov)P si

Pro první ošetření

Mospilan 20 SP

Mšice nespátríte více

Acetamiprid 200 g/kg

160 g/ha (0,008%)

- účinný při vyšších teplotách
- systémový účinek - účinkuje na škůdce i v nových přírůstcích
- dlouhodobé reziduální působení
- ekonomický výhodné

Dávkování vody 2000 l/ha
Ošetřujte podle signalizace před květem

Ortus 5 SC

Na svilušky bič - do týdne jsou pryč

Fenpyroximát 51,2 g/l

0,125%

- výborný účinek na nymfy a dospělce
- možnost použití při vyšších teplotách (do 25 °C)

2,5 l/ha dbejte na dostatečné pokrytí aplikační kapalinou, 2000 l vody/ha

Kanemite 15 SC

Nová alternativa

Acechinocyl 150 g/l

0,15%

- nová účinná látka
- velmi rychlý nástup účinku

3 l/ha na všechny vývojové stadia svilušek, 2000 l vody/ha



BBCH 00–57



BBCH 10–87



podle signalizace
BBCH 10–59



podle signalizace
BBCH 10–65



podle -signalizace
BBCH 10–80



podle signalizace
BBCH 10–80

