Rozsah povoleného použití

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka
brambor	mandelinka bramborová	0,06 kg/ha	7	3) max. 1×
jádroviny (jabloň, hrušeň, kdouloň, mišpule)	mšice, vlnatka krvavá	0,01 % 1000 l vody/ha	28	3) max. 1×
jabloň	obaleč jablečný	0,025 % 1000 l vody/ha	14	3) max. 1×
chmel otáčivý	mšice chmelová	0,008 % 2000 l vody/ha	42	3) max. 1×
okrasné rostliny	molice skleníková, mšice, mšice bavlníková včetně	0,25 kg/ha nebo 0,04 %	3	3) max. 2×
rajče pouze ve skleníku	mšice	0,125 kg/ha 400–600 l/ha	14	3) BBCH 51–69 max. 2×
okurka pouze ve skleníku	mšice	0,125 kg/ha nebo 0,02 %	7	3) BBCH 51–69 max. 2×

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka
řepka olejka	krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý	0,12 kg/ha	AT	3) max. 1×
řepka olejka	blýskáček řepkový	0,08–0,1 kg/ha	AT	3) max.1×
řepka olejka	bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový	0,15–0,18 kg/ha	AT	3) max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Rozšířené použití přípravku povoleného dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb. a menšinového použití přípravku povoleného dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
řepka olejka ozimá	zápředníček polní	0,15 kg/ha	AT	1) od: 10 BBCH, do: 19 BBCH	
mák setý	bejlomorka maková	0,150 kg/ha 300 l vody/ha	AT	1) od: 55 BBCH, do 61 BBCH 2) podle signalizace	
slunečnice	potemník písečný	0,150 kg/ha 300–500 l vody/ha	AT	1) od: 10 BBCH do 39 BBCH 2) podle signalizace	
slunečnice	klopušky, třásněnky	0,150 kg/ha 300–500 l vody/ha	AT	1) od: 10 BBCH do 65 BBCH 2) podle signalizace	

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
peckoviny mimo meruňka, broskvoň	štítenka zhoubná	0,25 kg/ha 300–1000 l vody/ha	AT	1) max. 1× 2) podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf	
meruňka, broskvoň	štítenka zhoubná	0,25 kg/ha 300–1000 l vody/ha	14	2) podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf	
třešeň, višeň	zobonosky	0,25 kg/ha 300–1000 l vody/ha	14	1) nejpozději na počátku růstu plůdků, max. 2× 2) podle signalizace	
třešeň, višeň	květopas peckový	0,25 kg/ha 300–1000 l vody/ha	14	1) max. 1× 2) podle signalizace	
třešeň, višeň	vrtule třešňová	0,25 kg/ha 300–1000 l vody/ha	14	1) max. 1× 2) podle signalizace	
slivoň	zobonosky	0,25 kg/ha 300–1000 l vody/ha	14	1) nejpozději na počátku růstu plůdků, max. 1×. 2) podle signalizace	
maliník, ostružiník	bejlomorka ostružiníková	0,25 kg/ha	49	1) před květem do balového stadia květu, po sklizni	
jetel luční	nosatčíci rodu *Apion*	0,15 kg/ha	AT	1) před květem až první rozkvetlé hlávky 2) podle signalizace při překročení prahu škodlivosti	6) semenné porosty
nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady	křísi	0,15 kg/ha	AT	2) podle signalizace	
cukrovka	makadlovka řepná	0,12 kg/ha	28	1) od: 31 BBCH, do: 39 BBCH	
ořešák	vrtule ořechová	0,25 kg/ha	14	od 70 BBCH, do 89 BBCH	
ostropestřec mariánský	mšice, babočka bodláková - housenky	0,15–0,25 kg/ha	14	od 14 BBCH, do 51 BBCH	množitelské porosty

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
cukrovka	200–400 l/ha	postřik	1×
mák setý	300 l/ha	postřik	1×
slunečnice	300–500 l/ha	postřik	1× v průběhu vegetačního období
peckoviny mimo meruňka, broskvoň	300–1000 l/ha	postřik, rosení	1× za rok
meruňka, broskvoň	300–1000 l/ha	postřik, rosení	1× za rok
třešeň, višeň	300–1000 l/ha	postřik, rosení	2× za rok (květopas peckový 1×, vrtule třešňová 1×, zobonosky 2×), interval mezi aplikacemi 10 dnů
slivoň	300–1000 l/ha	postřik, rosení	1× za rok
maliník, ostružiník	200–1000 l/ha	postřik, rosení	2× za rok, interval mezi aplikacemi 10 dnů
jetel luční	300–400 l/ha	postřik	1× za rok
nezemědělská půda, trávníky	300–600 l/ha	postřik, rosení	1× za rok
veřejně přístupné plochy, zahrady	300–600 l/ha (až 1000 l/ha pro prostorové kultury)	postřik, rosení	1× za rok
řepka olejka ozimá	200–600 l/ha	postřik	1× na podzim
ořešák	600–1500 l/ha	postřik, rosení	1× za rok
ostropestřec mariánský	200–400 l/ha	postřik	2×, interval mezi aplikacemi 7 dnů