

Rozsah povoleného použití

Plodina	Plevele	Dávkování	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL
pšenice ozimá, ječmen jarní	plevele dvouděložné jednoleté	0,2 kg/ha 300 l vody/ha	1) od BBCH 19 do BBCH 29 2) od BBCH 11 do BBCH 14, maximálně do BBCH 16 3) max. 1× na jaře
kukuřice	dvouděložné plevele	0,15 kg/ha 200-300 l vody/ha	1) od BBCH 12 do BBCH 16 2) od BBCH 12 do BBCH 14, maximálně do BBCH 16
ječmen ozimý, žito ozimé	plevele dvouděložné	0,2 kg/ha 300 l vody/ha	1) od BBCH 21 do BBCH 29 2) od BBCH 12 do BBCH 14, maximálně do BBCH 16 3) max. 1× na jaře

Rozšíření povolení na menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina	Plevele	Dávkování	OL	Poznámka 1) Plodina, 2) Plevelle
čirok dvoubarevný	plevelle dvouděložné	0,15–0,2 kg/ha	AT	1) od: 12 BBCH do: 16 BBCH 2) od: 12 BBCH do: 14 BBCH, max. 16 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace nebo poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití: čirok. Dávka vody: 200–300 l/ha. Způsob aplikace: postřik. Max. počet aplikací v plošině: max. 1× na jaře