

## Rozsah povoleného použití

Plodina	Plevele	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL
kukuřice, slunečnice	plevele dvouděložné a jednoděložné	1,2-1,4 l/ha 250-300 l vody/ha	AT	3) před setím se zapravením nebo preemergentně 3) max. 1×
cukrovka	plevele jednoleté jednoděložné a dvouděložné	0,9 l/ha 250-300 l vody/ha	AT	1) od: BBCH 16, do: BBCH 18 3) max. 1× postemergentně
cukrovka, řepa krmná	plevele jednoleté dvouděložné	0,15 l/ha + TM partner 1. aplikační termín 0,3 l/ha + TM partner 2. aplikační termín 0,45 l/ha + TM partner 3. aplikační termín 200-300 l vody/ha	90	1) od: BBCH 10, do: BBCH 31 3) max. 3× postemergentně
kukuřice	plevele dvouděložné, plevele jednoděložné	1,4 l/ha 250-300 l vody/ha	AT	1) od: 10 BBCH, do: BBCH 16 3) max. 1× postemergentně

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

## Rozšíření použití přípravku povolené dle § 37 zákona 326/2004 Sb., v platném znění

Plodina	Plevele	Dávkování	OL (dny)	Poznámka
sója luštinatá	plevele jednoleté jednoděložné a plevle jednoleté dvouděložné	1,2-1,4 l/ha (300-400 l vody/ha)	AT	1) BBCH 00-03 preemergentně do 3 dnů po zasetí 3) max. 1x

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Způsob použití: pozemní postřik.

Dávka vody: 300-400 l/ha

Maximální počet ošetření plodiny v průběhu vegetačního období: 1x

Termín aplikace: preemergentně do 3 dnů po zasetí a od BBCH 00 (suché semeno) do BBCH 03 (konec bobtnání semen)

Druhov a odrůdová citlivost: není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

## Rozšíření povolení na menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina	Plevele	Dávkování	OL	Poznámka
ovocné školky, okrasné školky	plevele dvouděložné, plevele jednoděložné	1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC	AT	
čirok dvoubarevný	plevele dvouděložné jednoleté, plevele jednoděložné jednoleté	1,2 l/ha	AT	

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Aplikace je preemergentní do 3 dnů po zasetí, nebo postemergentní v BBCH plodiny 12-16

## Rozšíření povolení na menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina	Plevele	Dávkování	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
světlice barvířská	plevele jednoděložné jednoleté, plevle dvouděložné jednoleté	0,9-1,4 l/ha	1) preemergentně, postemergentně časně 2) preemergentně, postemergentně BBCH 10	6) všechna určení mimo výživu lidí