Registrované použití

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
pšenice	kyjatka osenní, mšice střemchová, kyjatka travní, kohoutek černý	0,35 l/ha	28	1) od: 51 BBCH, do: 79 BBCH	5) pole
řepka olejka	blýskáček řepkový	0,35 l/ha	28	1) od: 51 BBCH, do: 59 BBCH	5) pole
řepka olejka	bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový	0,35 l/ha	28	1) od: 65 BBCH, do: BBCH 80	5) pole
tritikale	mšice, kohoutek černý	0,35 l/ha	28	1) od: 51 BBCH, do: 79 BBCH	5) pole
kukuřice	bázlivec kukuřičný	0,35 l/ha	AT	1) od: 61 BBCH, do: 69 BBCH 2) podle signalizace	5) pole
brambor	mšice	0,35 l/ha	14	1) od: 20 BBCH, do: 89 BBCH 2) podle signalizace	5) pole

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
brambor	mandelinka bramborová	0,2 l/ha	14	1) od: 20 BBCH, do: 89 BBCH 2) podle signalizace	5) pole
cukrovka	mšice broskvoňová, mšice maková	0,35 l/ha	28	1) od: 20 BBCH, do: 35 BBCH 2) podle signalizace	5) pole

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
pšenice, tritikale	200–400 l/ha	postřik	2×	14 dnů
řepka olejka, kukuřice	200–400 l/ha	postřik	1×	
brambor	200–700 l/ha (mšice), 200–450 l/ha (mandelinka bramborová)	postřik	1×	
cukrovka	200–800 l/ha	postřik	1×	

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
vojtěška	klopuška chlupatá, klopuška světlá, klopuška černá, klopuška polní	0,35 l/ha	AT	1) od: 51 BBCH, do: 59 BBCH nebo, od: 69 BBCH, do: 71 BBCH	6) semenné porosty
vojtěška	kyjatka hrachová	0,35 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH nebo, od: 69 BBCH, do: 79 BBCH	6) semenné porosty
jetel	nosatčíci rodu *Apion* (nosatčík jetelový, nosatčík obecný)	0,35 l/ha	AT	1) od: 51 BBCH, do: 59 BBCH	6) semenné porosty
jetel	kyjatka hrachová	0,35 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH nebo, od: 69 BBCH, od: 85 BBCH	6) semenné porosty
lesknice kanárská	kohoutek modrý, kohoutek černý	0,35 l/ha	56	1) od: 11 BBCH, do: 69 BBCH	
lesknice kanárská	kyjatka travní, mšice střemchová, kyjatka osenní	0,35 l/ha	56	1) od: 11 BBCH, do: 69 BBCH	
mák setý	bejlomorka maková, krytonosec makovicový	0,25 l/ha	AT	1) od: 55 BBCH, do: 59 BBCH	
mák setý	mšice	0,25 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	
slunečnice	klopušky	0,25 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	
brambor	mšice	0,4 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH a od: 69 BBCH, do 85 BBCH	6) sadbové
hrách, bob	kyjatka hrachová, zrnokaz hrachový	0,35–0,45 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	6) semenné porosty
hořčice	blýskáček řepkový	0,35 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	6) semenné porosty
ředkev olejná	blýskáček řepkový	0,35 l/ha	28	1) od: 51 BBCH, do: 59 BBCH	

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
vojtěška, jetel, lesknice kanárská, ředkev olejná	200–400 l/ha	postřik	1×
mák setý	300 l/ha	postřik	1×
hrách, bob, hořčice	300–400 l/ha	postřik	1×
slunečnice	300–500 l/ha	postřik	1×
brambor	300–600 l/ha	postřik	1×