Rozsah povoleného použití

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka k plodině	Poznámka k dávkování
pšenice ozimá, žito, tritikale	stéblolam	0,8 l /ha	35	na jaře, od: 25 BBCH, do: 32 BBCH	max. 1× na jaře
pšenice, žito, tritikale	braničnatka pšeničná	0,8 l /ha	35	od: 30 BBCH, do: 61 BBCH	
pšenice, žito	braničnatka plevová	0,8 l /ha	35	od: 30 BBCH, do: 61 BBCH	
pšenice, žito, tritikale	padlí travní	0,8 l /ha	35	od: 30 BBCH, do: 61 BBCH	max. 1×
ječmen jarní	padlí travní	0,8 l/ha	35	od: 30 BBCH, do: 61 BBCH	max. 1×
pšenice, žito, tritikale	rez pšeničná, rez plevová	0,8 l/ha	35	od: 30 BBCH, do: 61 BBCH	
ječmen jarní	rez ječná	0,8 l/ha	35	od: 30 BBCH, do: 61 BBCH	
pšenice	fuzariózy klasů	0,8 l/ha	35	od: 59 BBCH, do: 69 BBCH	
ječmen jarní	hnědá skvrnitost ječmene	0,8 l/ha	35	od: 30 BBCH, do: 61 BBCH	max. 1×
řepka olejka	hlízenka obecná	0,7 l/ha	56	od: 53 BBCH, do: 59 BBCH	

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
pšenice, žito, tritikale	100–400 l/ha	postřik	3×	14–21 dnů
ječmen jarní	100–400 l/ha	postřik	2×	14–21 dnů
řepka olejka	100–400 l/ha	postřik	1×	

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění:

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
hořčice	fomová hniloba brukvovitých	0,7 l/ha	56		4) max. 2x na podzim 5) pole
	hlízenka obecná	0,7 l/ha	56	1) od: 53 BBCH, do: 59 BBCH	4) max. 1x 5) pole
slunečnice	fomová hniloba slunečnice, červenohnědá skvrnitost slunečnice, rzivost slunečnice, septoriová skvrnitost listů, hlízenka obecná	0,7 l/ha	AT	1) od: 51 BBCH, do: 61 BBCH	5) pole
brukev řepák ozimý, řepice olejná, ředkev olejná	hlízenka obecná	0,7 l/ha	AT	1) od: 59 BBCH, do: 65 BBCH	5) pole
len setý	hlízenka obecná, septoriová stonková pásovitost lnu, plíseň šedá	0,7 l/ha	AT	1) od: 51 BBCH, do: 65 BBCH	5) pole
okrasné rostliny	rzi, skvrnitost listů, padlí, regulace růstu	0,8 l/ha	6	1) od: 14 BBCH, do: 55 BBCH mimo BBCH 40-49	5) venkovní prostory, chráněné prostory 6) produkční plochy
trávníky	houbové choroby	0,8 l/ha	AT	1) od: 25 BBCH, do: 69 BBCH	5) venkovní prostory
	houbové choroby	0,8 l/ha	AT	1) od: 25 BBCH, do: 69 BBCH	5) venkovní prostory 6) semenné porosty

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
hořčice	100–400 l/ha	postřik	2×	28–70 dnů
slunečnice	100–400 l/ha	postřik	1×	
brukev řepák, řepice olejná, ředkev olejná, len setý	300–400 l/ha	postřik	1×	
okrasné rostliny	500–1500 l/ha	postřik	3× za rok	14 dnů
trávníky	300–400 l/ha	postřik	1× za rok	