

## Doporučené dávkování

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL
pšenice ozimá	kyjatka osenní, mšice střemchová, kyjatka travní, kohoutek černý	0,25 l/ha	28	1) od: 51 BBCH, do: 79 BBCH
řepka olejka	blýskáček řepkový	0,2 l/ha	28	1) od: 51 BBCH, do: 59 BBCH
řepka olejka	krytonosci	0,25 l/ha	28	1) od: 69 BBCH, do: BBCH 71
řepka olejka	bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový	0,3 l/ha	28	1) od: 69 BBCH, do: BBCH 71
tritikale	mšice, kohoutek černý	0,25 l/ha	28	1) od: 51 BBCH, do: 79 BBCH

## Registrované použití

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL
pšenice ozimá	kyjatka osenní, mšice střemchová, kyjatka travní, kohoutek černý	0,35 l/ha	28	1) od: 51 BBCH, do: 79 BBCH
řepka olejka	blýskáček řepkový	0,35 l/ha	28	1) od: 51 BBCH, do: 59 BBCH
řepka olejka	bejlmorka kapustová, krytonosec šešulový	0,35 l/ha	28	1) od: 65 BBCH, do: BBCH 80
tritikale	mšice, kohoutek černý	0,35 l/ha	28	1) od: 51 BBCH, do: 79 BBCH

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
pšenice ozimá	200-400 l/ha	postřik	2x	14 dnů
řepka olejka	200-400 l/ha	postřik	1x	

## Menšinnové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
vojtěška	klopuška chlupatá, klopuška světlá, klopuška černá, klopuška polní	0,35 l/ha	AT	1) od: 51 BBCH, do: 59 BBCH nebo, od: 69 BBCH, do: 71 BBCH	6) semenné porosty
vojtěška	kyjatka hrachová	0,35 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH nebo, od: 69 BBCH, do: 79 BBCH	6) semenné porosty
jetel	nosatčici rodu <i>Apion</i> (nosatčík jetelový, nosatčík obecný)	0,35 l/ha	AT	1) od: 51 BBCH, do: 59 BBCH	6) semenné porosty
jetel	kyjatka hrachová	0,35 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH nebo, od: 69 BBCH, od: 85 BBCH	6) semenné porosty
lesknice kanárská	kohoutek modrý, kohoutek černý	0,35 l/ha	56	1) od: 11 BBCH, do: 69 BBCH	
lesknice kanárská	kyjatka travní, mšice střemchová, kyjatka osenní	0,35 l/ha	56	1) od: 11 BBCH, do: 69 BBCH	
mák setý	bejlmorka maková, krytonosec makovicový	0,25 l/ha	AT	1) od: 55 BBCH, do: 59 BBCH	
mák setý	mšice	0,25 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	
slunečnice	klopušky	0,25 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	
brambor	mšice	0,4 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH a od: 69 BBCH, do 85 BBCH	6) sadbové
hrách, bob	kyjatka hrachová, zrnokaz hrachový	0,35–0,45 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	6) semenné porosty
hořčice	blýskáček řepkový	0,35 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	6) semenné porosty
ředkev olejná	blýskáček řepkový	0,35 l/ha	AT	1) od: 51 BBCH, do: 59 BBCH	

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.  
 AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

<b>Plodina</b>	<b>Dávka vody</b>	<b>Způsob aplikace</b>	<b>Max. počet aplikací v plodině</b>
vojtěška, jetel, lesknice kanárská, ředkev olejná	200-400 l/ha	postřik	1×
mák setý	300 l/ha	postřik	1×
hrách, bob, hořčice	300-400 l/ha	postřik	1×
slunečnice	300-500 l/ha	postřik	1×
brambor	300-600 l/ha	postřik	1×