Rozsah povoleného použití

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL
řepka olejka ozimá	hlízenka obecná	0,5 kg/ha	AT	1) od: 55 BBCH do: 69 BBCH
řepka olejka ozimá	fomové černání stonků řepky	0,5 kg/ha	AT	1) od: 31 BBCH do: 59 BBCH, na jaře

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění

Plodina	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
slunečnice, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská	hlízenka obecná, fomová hniloba slunečnice, alternáriová skvrnitost slunečnice	0,5 kg/ha	AT	1) od: 51 BBCH, do: 65 BBCH	5) pole
mák setý, len setý	hlízenka obecná, fomová hniloba, alternáriová skvrnitost	0,5 kg/ha	AT	1) od: 51 BBCH, do: 65 BBCH	5) pole

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.