

Rozsah povoleného použití

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka k plodině	Poznámka k dávkování
réva	padlí révy plíseň révy plíseň šedá	0,25 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) podle signalizace	6) hrozny stolní, hrozny moštové
jahodník	plíseň šedá	0,75 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky
okurka	padlí	0,5 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky
patizon, cuketa	padlí	0,5 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky
meloun cukrový, meloun vodní, tykev	padlí	0,5 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky

Měššinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařizení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění:

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
řepka olejka, hořčice	plíseň šedá, hlíženka obecná	0,25 kg/ha	AT	1) od 12 BBCH, do 80 BBCH 5) pole	
slunečnice	plíseň šedá, hlíženka obecná	0,25 kg/ha	AT	1) od 12 BBCH, do 80 BBCH 5) pole	
jabloň	strupovitost	0,25 kg/ha	AT	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) venkovní porosty	
jahodník	plíseň šedá	0,5 kg/ha	AT	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) pole	
okurka, patizon, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, tykev	padlí	0,5 kg/ha	AT	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) pole	
salát, salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, čekanka salátová, kapusta kadeřavá, špenát	plíseň šedá, plíseň	0,75 kg/ha	AT	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) pole	
rajče, baklažán	plíseň šedá	0,5 kg/ha	AT	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) pole	
zelenina košťalová, zelenina cibulová, zelenina kořenová a hlíznatá	plíseň	0,75 kg/ha	AT	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) pole	
byliny	plíseň šedá	0,75 kg/ha	AT	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) chráněné prostory	
okrasné rostliny	plíseň šedá	0,75 kg/ha	-	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) venkovní prostory, chráněné prostory	
trávníky	houbové choroby	0,75 kg/ha	-	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) venkovní prostoty	

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka k plodině	Poznámka k dávkování
salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, štěrbák zahradní (endivie) čekanka salátová	plíseň šedá	0,75 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky
rajče, baklažán	plíseň šedá	0,5 kg/ha	1 den	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
réva	200-1600 l/ha	postřik, rosení	10× za rok, plíseň šedá 5× za rok	7-10 dnů
jahodník	100-1000 l/ha	postřik	8× za rok	7 dnů
okurka, patizon, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, tykev obecná, salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, endivie širokolistá, štěrbák zahradní (endivie), rajče, baklažán	100-400 l/ha	postřik	8×	7 dnů

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
řepka olejka, hořčice, slunečnice	200–400 l/ha	postřik	3×	7 dnů
jabloň	600–1000 l/ha	postřik	10× za rok	7–10 dnů
jahodník	100–1000 l/ha	postřik	8× za rok	7 dnů
okurka, patizon, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, tykev, salát, salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, čekanka salátová, kapusta kadeřavá, špenát, rajče, baklažán, zelenina košťálová, zelenina cibulová, zelenina kořenová a hlíznatá, byliny	100–1000 l/ha	postřik	8×	7 dnů
okrasné rostliny	500–2000 l/ha	postřik	8× za rok	7 dnů
trávníky	500–1000 l/ha	postřik	25× za rok	7 dnů

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.