

Rozsah povoleného použití

Plodina	Plevelé	Dávkování	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé	plevelé jednoděložné jednoleté, plevelé dvouděložné jednoleté	0,4 l/ha	1) od BBCH 00 do BBCH 09 2) preemergentně
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé	plevelé jednoděložné jednoleté, plevelé dvouděložné jednoleté	0,4 l/ha	1) od BBCH 10 do BBCH 13 2) do BBCH 13
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé	plevelé jednoděložné jednoleté, plevelé dvouděložné jednoleté	0,2 l/ha	1) od BBCH 00 do BBCH 09 2) preemergentně
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé	plevelé jednoděložné jednoleté, plevelé dvouděložné jednoleté	0,2 l/ha	1) od BBCH 00 do BBCH 09 2) do BBCH 13

OL - ochranná lhůta

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
ječmen ozimý, pšenice ozimá, triticale ozimé, žito ozimé	200-300 l/ha	postřik	1x na podzim