

Sumi**MAX**[®]SUMIMAXIMÁLNÍ
SILOU**Herbicid pro podzimní ošetření ozimé pšenice proti jednoděložným a dvouděložným plevelům.**

- Ojedinělá účinná látka
- Široké plevelohubné spektrum
- Bez omezení v OP II. stupně povrchových i podzemních vod
- Proklatě nízká cena

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Sumimax[®] působí přes půdu i přes listy. K herbicidnímu účinku dochází již po 1-3 dnech. Účinek urychluje sluneční záření a dostatečná půdní vlhkost.

ÚČINNÁ LÁTKA A DÁVKOVÁNÍ

- flumioxazin 500 g/kg
- 60 g/ha

APLIKACE A DOPORUČENÍ

- preemergentně
- cPOST, stadium pšenice BBCH 10-14 (první až čtvrtý list)
- nejlepšího účinku na plevely dosáhnete při aplikaci krátce po vzejití pšenice (BBCH 10-12), kdy plevely nepřekročí růstovou fázi děložních lístků
- pro rozšíření účinnosti na vzešlý výdrol řepky využijte TM s **Gropper[®] SX** (7,5 g/ha)
- pro rozšíření účinnosti na trávovité plevely (lipnice roční, psárka polní, sveřepy) použijte TM s herbicidem **Vulcanus[®] SC** (0,2-0,4 l/ha)

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Citlivé plevely:

chundelka metlice (včetně rezistentních populací), lipnice roční, hluchavky, heřmánkovité plevely, mák vlčí, violka rolní, rozrazil, hořčice rolní, ředkev ohnice, lebeda rozkladitá, rdesna, kapustka obecná, ptačinec žabinec, chrpa modrá, pomněnka rolní, kokoška pastušá tobolka, kakost měkký, vzcházející výdrol řepky, kontryhel obecný, konopice rolní, starček obecný, penízek rolní, víkev huňatá, hulevník lékařský

VULCANUS[®] SCZAČÁTEK
KONCE PLEVELŮ**Herbicid k hubení jednoletých jednoděložných plevelů v ozimých obilninách.**

- Výborný účinek na trávovité plevely
- Pomáhá v boji se sveřepy
- Řeší rezistentní chundelku

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Vulcanus[®] SC je přijímán převážně kořenovým systémem, hypokotylem a klíčovými výhonky. Představuje špičkové řešení v boji s těžce hubitelnými jednoletými trávovitými plevely v ozimých obilninách. Řeší lipnici roční, psárku polní, sveřepy a chundelku metlici včetně jejich rezistentních forem a pomáhá v boji proti některým dvouděložným plevelům.

ÚČINNÁ LÁTKA A DÁVKOVÁNÍ

- flufenacet 600 g/l
- 0,2-0,4 l/ha

APLIKACE A DOPORUČENÍ

V případě požadované vysoké účinnosti na psárku polní aplikujte Vulcanus SC preemergentně. Možná je i cPOST aplikace, kdy plevely mají max. jeden pravý list a obilniny jsou ve fázi BBCH 10-13 (do 3. listu). Vulcanus[®] SC lze aplikovat v obou případech společně s herbicidem Sumimax (0,2-0,4 l/ha + 60 g/ha).

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

- 0,2 l/ha - chundelka metlice (včetně rezistentních populací), lipnice roční
- 0,4 l/ha - rozšíření spektra na psárku polní, sveřepy

RESKATOR[®]**Nejúčinnější podzimní trojsložkový herbicid do všech ozimých obilnin pro hubení chundelky metlice a širokého spektra dvouděložných plevelů.**

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Reskator[®] proniká do rostlin povrchem listů a lodých, kde je rozváděn akropetálně i bazipetálně. Je přijímán také klíčovými rostlinami a kořenovým systémem. Přípravek působí systémově jako regulátor růstu.

Plevely krátce po postřiku zastavují růst. Dochází k dekolraci a později k deformacím plevelů. První příznaky jsou viditelné za 2-6 dnů po aplikaci, během 4-6 týdnů dochází k úhynu plevelů.

Reskator[®] má částečně půdní reziduální účinek a omezuje vzcházení později klíčících plevelů.

ÚČINNÁ LÁTKA A DÁVKOVÁNÍ

- diflufenican 100 g/l, florasulam 3,75 g/l, penoxsulam 15 g/l
- 1 l/ha

VAŠICH OZIMŮ
PROTEKTOR

- Široký plevelohubný záběr.
- Dvouděložné plevely umí až do 10 pravých listů.
- Aplikace možná v rozmezí teplot 5-25 °C

APLIKACE A DOPORUČENÍ

- na podzim od vytvoření 1. listu obilniny do fáze třetí odnože viditelné (BBCH 11-23)
- jednotná dávka 1 l/ha
- teplotní rozmezí pro aplikaci je 5-25 °C
- Reskator vykazuje nejlepší účinnost na plevely při jejich růstové fázi 2-10 pravých listů
- u chundelky metlice je žádoucí aplikace do růstové fáze 2. pravého listu

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Citlivé plevely:

chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovce přímořský, kokoška pastušá tobolka, penízek rolní, ředkev ohnice, výdrol řepky olejky, ptačinec žabinec, mák vlčí, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, violka rolní, violka trojbarevná, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský.

**BALÍČEK****SUMIMAX[®] + VULCANUS[®] SC (1,5 kg + 5 l)****Nejsilnější TM proti úporným trávovitým plevelům.**

Oba přípravky spolehlivě hubí také rezistentní populace chundelky metlice. TM využijte v případě cíleného zaměření proti lipnici roční, psárce polní a sveřepům.