

Rozsah povoleného použití

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka k plodině	Poznámka k dávkování
jabloň	strupovitost jabloně	0,2 l/ha	28	1) od: 57 BBCH, do: 72 BBCH	5) venkovní prostory
řepka olejka ozimá	alternáriová skvrnitost brukvovitých, hlízenka obecná	0,5 l/ha	74	1) od: 60 BBCH, do: 65 BBCH	5) pole
pšenice ozimá	helmintosporióza pšenice, padlí travní, rez pšeničná, braničnatka pšeničná	0,5 l/ha	62	1) od: 33 BBCH, do: 55 BBCH	5) pole
tritikale ozimé	padlí travní, rez pšeničná, braničnatka pšeničná	0,5 l/ha	62	1) od: 33 BBCH, do: 55 BBCH	5) pole

brambor	hnědá skvrnitost bramborových listů	0,3 l/ha	14	1) od: 51 BBCH, do: 91 BBCH	5) pole
cukrovka	cerkosporióza řepy	0,32-0,4 l/ha	35	1) od: 31 BBCH, do: 49 BBCH	5) pole

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
brambor	200-400 l/ha	postřik	4×	10 dnů
pšenice ozimá, tritikale ozimé, cukrovka	200-300 l/ha	postřik	2×	14 dnů
řepka olejka ozimá	300 l/ha	postřik	1×	