Rozsah povoleného použití

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka k plodině	Poznámka k dávkování
réva	padlí révy plíseň révy plíseň šedá	0,25 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) podle signalizace	6) hrozny stolní, hrozny moštové
jahodník	plíseň šedá	0,75 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky
okurka	padlí	0,5 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky
patizon, cuketa	padlí	0,5 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky
meloun cukrový, meloun vodní, tykev	padlí	0,5 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka k plodině	Poznámka k dávkování
salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, štěrbák zahradní (endivie) čekanka salátová	plíseň šedá	0,75 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky
rajče, baklažán	plíseň šedá	0,5 kg/ha	1 den	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 2) preventivně	5) skleníky

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
réva	200–1600 l/ha	postřik, rosení	10× za rok, plíseň šedá 5× za rok	7–10 dnů
jahodník	100–1000 l/ha	postřik	8× za rok	7 dnů
okurka, patizon, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, tykev, salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, štěrbák zahradní (endivie), rajče, baklažán	100–400 l/ha	postřik	8×	7 dnů

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění:

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
řepka olejka, hořčice	plíseň šedá, hlízenka obecná	0,25 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 80 BBCH 5) pole	
slunečnice	plíseň šedá, hlízenka obecná	0,25 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 80 BBCH 5) pole	
jabloň	strupovitost	0,25 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) venkovní porosty	
jahodník	plíseň šedá	0,5 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) pole	
okurka, patizon, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, tykev	padlí	0,5 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) pole	
salát, salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, čekanka salátová, kapusta kadeřavá, špenát	plíseň šedá, plíseň	0,75 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) pole	
rajče, baklažán	plíseň šedá	0,5 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) pole	
zelenina košťálová, zelenina cibulová, zelenina kořenová a hlíznatá	plíseň	0,75 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) pole	
byliny	plíseň šedá	0,75 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) chráněné prostory	

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
okrasné rostliny	plíseň šedá	0,75 kg/ha	-	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) venkovní prostory, chráněné prostory	
trávníky	houbové choroby	0,75 kg/ha	-	1) od 12 BBCH, do 89 BBCH 5) venkovní prostotry	
brambor	hnědá skvrnitost bramborových listů, plíseň bramboru	0,25 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 80 BBCH 5) pole	
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová	cerkosporióza řepy	0,25 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 80 BBCH 5) pole	
mák setý	helmintosporióza máku, padlí máku, plíseň máku, plíseň šedá	0,25 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 80 BBCH 5) pole	
hrách, fazol, bob, sója, lupina, čočka	padlí, antraknóza, hlízenka obecná, plíseň, plíseň šedá	0,25 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 80 BBCH 5) pole	
chmel	plíseň chmele	0,25 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 80 BBCH 5) pole	
řepka olejka	plíseň zelná, fomové černání stonků řepky, verticiliové vadnutí řepky	0,25 kg/ha	1	1) od 12 BBCH, do 80 BBCH 5) pole	

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
(–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
řepka olejka, hořčice, slunečnice, cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, hrách, fazol, bob, sója, lupina, čočka, mák setý	200–400 l/ha	postřik	3×	7 dnů
brambor	200–400 l/ha	postřik	6×	7 dnů
jabloň	600–1000 l/ha	postřik	10× za rok	7–10 dnů
jahodník	100–1000 l/ha	postřik	8× za rok	7 dnů
okurka, patizon, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, tykev, salát, salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, čekanka salátová, kapusta kadeřavá, špenát, rajče, baklažán, zelenina košťálová, zelenina cibulová, zelenina kořenová a hlíznatá, byliny	100–1000 l/ha	postřik	8×	7 dnů
okrasné rostliny	500–2000 l/ha	postřik	8× za rok	7 dnů
trávníky	500–1000 l/ha	postřik	25× za rok	7 dnů
chmel	1000–2500 l/ha	postřik	6× za rok	7 dnů

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.